
mmie



## DOSAGE DE L'ALBUMINE

### DANS LES URINES

## THÈSE

PRÉSENTÉE ET SOUTENUE A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE PROPESSIRIBS DE-

Le 18 décembre 1869.

AMICAGINE BOPOUR OBTENIR LE TITRE DE PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE

.enpim do PAR TAGRABOAT! . NO. Forming force (niques) LÉOPOLD POMMIER,

GATARBET.

Né à Bulgneville (Vosges),

INTERNE DES HÔPITAUX ET HOSPICES CIVILS DE PARIS, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION POUR LES SCIENCES PHARMACEUTIQUES,

PARIS

A. PARENT, IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 31, RUE MONSIEUR-LE-PRINCE, 31

1869

## ADMINISTRATEURS.

# MM. Bussy, directeur; CHATIN, professeur titulaire; CHATIN, professeur titulaire.

## PROFESSEUR HONORAIRE,

PRÉSENTER ET OUTRINO DE LE SUPERIMENTE

48 (Un - hoc 4868)	OFESSEURS DELEGUES DR LA
BERTHELOT Chimie organique.	PAGULTÉ DE MÉDECINE  MM. BOUCHARDAT  GAVARRET.

#### AGRÉGÉS.

MM. BAUDRIMONT.
L. SOUBEIRAN.
RICHE.
BOUIS.

MM. Bourgoin.

Jungfleisch.

Le Roux.

Marchand,

A. PARENT, IMPRIATION

Nora. - L'École ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises pa candidats.

#### A LA MÉMOIRE

## DE MES PARENTS

CHIMIOURS.

. MDORMATAN

### A MON ONCLE FOMMIER

Affection. - Dévouement.

1. Mercure puntié.

1. spin ford

2. Teintare d'extrait d'opium.

3. Proto-i dure de mercure.

3. Simp Copium.

4. Larar 's Sydenham UHAM 'C BLE MENA de memure. Pharmacien en chef de l'hôpital Necker.

#### A M. LE D' POTAIN

Médecin en chef à l'hôpital Necker.

#### A MES COLLÈGUES

De l'hôpital Necker et de l'hôpital des Enfants, 1868-1869.

#### GALÉNIQUES.

uques.

CHIMIQUES.

ALMIN V

- 1. Opium titrě.
- 2. Teinture d'extrait d'opium.
- 8. Sirop d'opium.
- 4. Laudanum de Sydenham, HAM
- B. Laudanum de Rousseau.

- 1. Mercure purifié.
- 2. Proto-chlorure de mercure.
- 3. Proto-iodure de mercure.
- 4. Bi-oxyde de mercure.
- 5. Sulfate de mercure noir.

A LIE WOT

Medechn en eigel eine ist ber ererer

A MES COLLECTIVES

to Phondral Keetor of the South tes southern administra-

### TOTAL DOSAGE DE L'ALBUMINE

# naite in a Marine Code of the state of the s

the control of the co

- place of the Philippine ost percent use solu-



L'idée première du procédé que je vais exposer m'a été suggérée par M. le D° Potain, médecin en chef à l'hôpital Necker: il m'a hargé de faire les dosages d'albumine nécessaires à l'établissement de la méthode, et a bien voulu m'autoriser à publier ce travail, pour lequel je réclame l'indulgence de mes juges. J'ai trouvé aussi, pour mes expériences, dans M. le D' Méhu, pharmacien en chef à l'hôpital Necker, un guide aussi obligeant qu'éclairé. Qu'il me soit permis d'offrir ici, à mes deux maîtres, le témoignage public de ma reconnaissance pour la bienveillance particulière dont ils m'ont toujours honoré!

Pour être clair, mon travail doit se diviser en quatre parties:

- 1 o De l'urine en général et des produits qu'elle contient à l'état normal :
- 2º Des différentes maladies accompagnées de production d'albumine dans les urines :
- 3º Principaux procédés employés jusqu'à ce jour pour doser l'albumine et causes d'erreurs qu'ils présentent;
  - 4º Methode qui fait l'objet de cette thèse.

#### CHAPITRE 1º7.

DE L'URINE A L'ETAT NORMAL ET DES PRODUITS OU'ELLE CONTIENT.

C'est un liquide limpide, de couleur ambrée variable, à réaction acide au moment de son émission, d'une saveur salée particulière, d'une odeur fade et nauséabonde; sa densité varie, suivant l'âge, le sexe et le régime, de 4,005 à 1,030 (6 à 7º Beaumé). Après son émission, l'urine se trouble, laisse déposer des sels, devient alcaline et exhale une odeur ammoniacale. La matière colorante de l'urine appelée urochrôme par M. le D' Thucidure, est jaune et très-soluble dans l'eau.

Les propriétés physiques de l'urine peuvent être modifiées par une foule de causes. Beaucoup d'aliments odorants ou cologés, par icommuniquent leur odeur ou leur couleur. De plus, ses propriétés sont plus ou moins prononcées, suivant le temps que le liquide a séjourné dans la vessie. L'urine rendue après l'ingestion d'une, sertaine quantité de liquide est très-claire, plus limpide est mains dense. Celle qui est expulsée deux ou trois heures après les repas est plus dense, plus colorée et moins abondante. Enfig, selle, du matin est plus foncée, plus dense et plus acide.

On ne peut donc spécifier, comme l'a fait Berzélius, les quantités de chaque substance que contient une urine, sans nisquer de recevoir de nombreuses objections. Je crois cependant qu'il est utile de donner ioi les résultats de ce savant chimiste, résultats qui ont fait foi dans la science, de 1809 à 1839.

4,	Urée	and the same	nin val.	1000		a line	30,10
	Acide lac	tique libre.				. 1	mine days har
	Lactate d	'ammoniaque					AW 1.
	Extrait d	e viande solul	le dans	l'ale	ool.	1 ( W.)	111111111111111111111111111111111111111
	Matières	extractives s	olubles	dans	l'al	eoola	Palbus in el
			4	4			#W 13 #

				R	epor	t.,			47,24
Acide uriq	ue	. "			٠,	/ w	. 1		1
Mucus de									0,32
Sulfate de	potasse.	.Goar	· 111	6 9	4	4 1			3,71
Sulfate de									3,16
; Phosphate									2,94
Biphospha	te d'am	moni	aque	. /		-1		n al	1.65
Sel marin.									4,45
Sel ammon								14. 1532	1,50
Phosphate	de chau	ıx et	de i	mag	nési				
Silice				-					-0,03
Eau									
tions la pre-	lemion	1.0	. 61		100	Tota	ıl.	. 1	,000,00

Dans cette analyse, il s'agissait sans doute d'urine du matin. Les travaux de Berzélius furent repris successivement par MM. Lehmann, Lecamu et Becquerel, et le chiffre d'urée contenue dans l'urine des yingt quatre heures fut reconnu, par ce dernier chimiste, être égal sculement à 47,537 pour 100.

Depuis cette époque, les perfectionnements apportés aux méthodes analytiques et micrographiques ont fait découvrir de nouvelles substances.

Voici, d'après M. Robin, la composition immédiate de l'urine :

Acide carbonique (quelquefois des traces),

Eau.

Silice (quelquefois des traces),

Chlorure de sodium,

Chlorure de potassium,

Chlorhydrate d'ammoniaque,

Sulfate de chaux (traces),

soude,

		_ 0 -	-			
Phosphate	de chaux d	les os,				
	acide de-ch	aux,			910,171 9	hin/.
	- de⋅so	ude (c'est à	lui que l'i	urine d	oit la pi	ropriété
8.77	de	rougir le to	urnesol),	- 116	14 to 11	6000
3,14	neutre de s	soude,		, · (p)	os obces	Sulfi
10.6		soude (à ce				
7.6.4	la rend	alcaline), -	enpreina	d appr	multiple	er gizt
-4						
I	magnésie,			'7	sinome	sd a
31/3	ammoniac	o-magnésie	n, de de	e elian	obate di	11.19
Carbonate	de chaux,					
U #80	de soude,					1115-4
הפוכו ועב	de potasse	(quelquefo	is à l'étai	t norm	al dans	la pre-
	mière ei	nfance),				
		(toujours r				
Lactate de — de — de	soude,	Probables ma lactique no l'émission, pas le princ	is non dir s'y forme par fermen ipe qui lui	ectement qu'acci tation du donne sa	démontridentellem a sucre, réaction s	es. L'acide ient après mais n'est icide.
Ovalate de	chaux (ac	cidentellem	ent intro	duit da	ng leg al	liments)
Urate de c	haux (quelo	quefois des	traces),	1, 17	1 11 Na	Depuis
Urate de n	agnésic,	Juli et que	1,045	14	min Ser	U.5 : 5)1)(H)
	re de soud				e 31 di	elles aub
- acid	e de soude,	noiti-7(m	in. la cu	109 00	Jana"	1007
do 1	antagen (dae	fracae)				
— d'an	nmoniaque,	de ob 1 oh	rquelois,	and) an	ib coort	Acide c
Hippurate	de soude,					Eat.,
Acide uriq	ue (des trac	ces, toujour	s acciden	telles o	u morb	ides),
- hipp	urique (des	traces),				Chlarar
Pneumate	de soude (d	les traces),				(bleen
Urée (en n	oyenne 12	, 102),				(hlotty
Créatine,			(53)			Stillate
Créatinine					000 /	Proper
Oratina (d.	on troops as	naidantalla	u marhi	dol		

Sucre de foie ou de diabète (quelquefois des traces, sans qu'il y

moléine, on a supresur and sometime sets the sets at a set of the set of the

-Mucosine (des traces normalement, plus ou moins, dans le ca-

-Urrosacine (matière colorante, en petite quantité) aug et ala citues

Dans cette longue liste, les quantités pondérables de chaque substance ne sont pas exprimées; M. Robin les a pourtant déterminées. Je n'ai pas voulu les reproduire ici, parce qu'il me semble qu'elles sont vraies pour le liquide soumis à l'examen, mais ne le sont pas pour d'autres.

En thèse générale, pour déterminer la quantité d'une substance contenue dans une uriné, il est bon d'opèrer sur le total des urines rendues dans les vingt quarre heures. M. Lécanu opérait même sur le mélange des urines de plusieurs jours. Il est bon aussi de remarquer que l'urine du matin, qui est le plus en rapport avec la composition du sang, est celle qui est la plus identique à elle-inème c'est donc sur elle qu'on doit porter le plus es observations.

## la maladus, non acubencut que l'arme contient de l'abbanine cone, amule application de la call STRIARIE, il successor acubelle

DES DIFFÉRENTES MALADIES OU ON TROUVE DE L'ALBUMINE DANS

Je ne veux pas énumérer ici toutes les maladies dans lesquelles on trouve de l'albumine dans les urines, je ne veux pas non plus discuter les causes qui l'amènent et les remèdes employés pour la faire disparaître. Je veux seulement rappeler qu'il existe deux sortes d'albuminurie; l'une passagère, l'autre permanente.

La première est un symptôme de peu de gravité, lorsqu'on ne

la laisse pas empirer. La lésion qui l'accompagne est un état finement granuleux, des cellules épithéliales du rein devenues presque opaques; elles sont assez abondantes pour masquer le noyau et èn déterminer rapidement l'atrophie.

L'albuminurie permenente doit préoccuper davantage le médedecin. Elle s'accompagne le plus souvent d'une hypertrophie considérable des cellules épithéliales du rein, de celles de sa portion corticale du moins, avec état granuleux un peu différent du précédent. Le tout est compliqué de la présence d'une quantité plus ou moins grande de granulations, ou gouttes graisseuses grosses et petites, dans les portions du rein devenues jaunâtre particulièrement.

Dans cette maladie, le poids d'albumine contenu dans les urines, varie non-sculement d'une personne à l'autre, mais elle n'est pas constante chez le même individu à des intervalles de temps très-rapprochés. Les causes qui influent sur sa quantité sont extrêmement nombreuses, et le genre d'alimentation est pour beaucoup dans le traitement de la maladie.

Il n'est pas de remèdes efficaces contre l'albuminurie, et le tannin, qu'on a beaucoup vanté dans ce genre d'affection, est bien souvent infidèle. Il importe donc que le médecin sache à chaque époque de la maladie, non-seulement que l'urine contient de l'albumine (une simple application de la chaleur le fui dirait sûrement), mais quelle quantité exacte elle en contient.

Le dosage rapide a été depuis longtemps reconnu nécessaire, nous allons passer en revue les moyens préconisés jusqu'à ce jour.

Je ne voux in sine year in the sentence

in hime. Hangraftee, de velo semente e note-

#### CHAPITRE III

DES DIFFÉRENTS MOYENS EMPLOYÉS POUR DOSER L'ALBUMINE ET DES INCONVÉNIENTS QU'ILS PRÉSENTENT.

Toutes les méthodes sont fondées sur la propriété que possède Palbumine: '1° de se coaguler par la chaleur; 2° d'être précipitée par divers réactifs, en formant avec eux des combinaisons insolubles, ou en devenant insoluble dans les liquides précipitants; 3° de dévier à gauche le plan de polarisation de la lumière polarisée.

Les procédés que nous allons énumérer sont applicables aussi bien aux liquides des cavités séreuses qu'aux urines.

Nous avons emprunté les détails qui vont suivre, à l'excellent travail publié dans le numéro de mars 1869 des Archives générales de médecine, par M. Méhu. On trouvera des détails opératoires qu'il est essentiel de ne pas négliger pour arriver à un bon résultat. Nous avons répété les opérations qui vont suivre, et ne nous sommes pas borné à copier seulement le travail de notre pharmacien en chef.

Dosage de l'albumine par l'action de la chaleur. — Si on chausse à 72° un liquide contenant de l'albumine, on ne tarde pas à voir ce corps se précipiter et se déposer en masse compacte, s'il est en notable quantité. Certains corps, tels que les acides acétiques et phoriques, le chlorure de sodium et le sulfate de soude, abaissent à 60° le point de cogulation. Les alcalis, au contraire, élèvent ce point au-dessus de 72°.

Avant de chauffer, il faut rendre le liquide limpide par filtration. et s'assurer qu'il présente une réaction franchement acide; s'il ne la possède pas naturellement, il faut ajouter goutte à goutte de l'acide acétique, jusqu'à ce que l'urine communique au papier de tournesol une couleur rouge. Si l'on oubliait cette précaution, on s'exposerait à avoir un chiffre trop élevé, grâce à la précipitation

des urates et des phosphates. D'un autre côté, si le liquide était alcalin, on laisserait en dissolution une quantité d'albumine d'autant plus grande, que l'alcalinité serait plus prononcée.

Cette précaution prise, on cherche, par un essai approximatif. la quantité d'urine, qui contient 4 décigrammes d'albumine, soit 30cc. on l'étend de quantité suffisante d'eau distillée pour obtenir 100cc.. ce sera 70cc, pour le cas qui nous occupe; on mêle exactement, on chauffe dans une capsule de porcelaine, à l'aide de la lampe à alcoel et on maintient à l'ébullition pendant quelques minutes. Il faut prendre une capsule et non un matras, car dans ce dernier vase, il arrive fréquemment qu'un liquide contenant de l'albumine ne se coagule pas, sans qu'on puisse en expliquer la cause. Lorsque l'albumine nage au milieu d'un liquide limpide, on le jette sur un filtre bien sec et pesé d'avance, on porte ensuite dans une étuve, on laisse refroidir le tout entre deux verres de montre, sur de l'acide sulfurique, puis on pèse le tout. Le poids obtenu, diminué de celui du filtre, exprime la quantité d'albumine contenue dans 30cc. d'urine. els opérations qui vont an en conclut que; 19 anvins the vine sucitare est

1,000cc. out litre, continued livrant le travelle

Posnae de l'albanine sur l'attende = 13,34.

\$ 72° un liquide contenant de l'athumine, on ne tarde pas à cor ce Nons recommandons d'étendre l'urine d'eau, pour qu'après la coagulation, la filtration se fasse plus facilement, et si nous ne faisons prendre que la quantité d'urine contenant de 3 à 4 décigrammes d'albumine, c'est pour que la dessiccation soit plus complète.

Ce procédé donne presque toujours un résultat moindre que celui auquel on doit s'attendre, nous avons constaté ce fait en essayant un liquide fait par nous avec de l'eau distillée et du blanc d'œuf en proportions connnes. il faut aimine to man a natural prosecute pas naturallement, il faut aimine pas naturallement, il faut aimine pas naturallement.

Méthode de Berzehus. — Elle est fondée aussi sur la propriété que possède l'albumine de se coaguler à 72°. On prend 50 cent. cubes

- -d'urine filtrée et acidulée avec de l'acide acétique en petite quantité, et on évapore à siccité.
- on recueille ce résidu avec de l'eau chaude, puis avec de l'alcool, on recueille ce résidu sur un filtre pesé sec, on dessèche le tout comme dans l'opération précédente et on pese de nouveau.
- On a pour différence le poids de l'albumine et des sels.
- on grille alors le filtre et l'albumine coagulée qu'il renferme, et quand l'incinération est parfaite, on déduit du poids de l'albumine brute, le poids des cendres, puis on rapporte le poids trouvé à un litre.
- of Ce procédé quoique plus compliqué que celui que nous avons udécrit précédemment, donne des résultats moins bons, à cause des matières colorantes et autres qui se fixent sur l'albumine." M. M. de presempté, soiruf : sonne de précis de l'albumine de presempté, soiruf : sonne de précis de l'albumine de presempté.
- of Dosage par l'acide azotique. On sait que l'acide azotique jouit de la propriété de caguler l'albumine à froid. En effet, si dans un liquide albumineux on verse une petite quantité de cet acide, on voit peu à peu un précipité se former. Telle est la réaction qui se passe toujours, mais elle n'est pas concluante, car si on se trouve en présence d'une urine chargéé d'urates alcalins, l'acide azotique décompose les urates, et précipité l'àcide urique moins soluble que les urates neutres dissous; on pourrait donc être induit en erreur. Pour lever les doutes, il suffit de chauffer le tout quelques instants, l'acide urique se reclissout, et on n'a plus que le précipité d'albumine qui persisteuel se raquo a chaupit ub zuerres as anilach.
- af Ce moyen est excellent pour démontrer la présence de l'albumine dans l'urine, mais comme procédé de dosage nous croyons pouvoir affiriner qu'it est toin det valoir le dosage par la chaleur soulen à 19 mil no ny otiquorq es ma supplicat source est 19 miles.
- eanEn effet, l'acide azotique ést impuissant à précipiter toute l'albumine dans une irrinet. Si où n'en ajoute qu'une petité quantité; set qu'on chaûffe pour rendre la précipitation complète; l'acide régigit sur le précipité; le jaurit et le transforme d'autant plus rapidement

en acide xanthoprotéique, que la quantité d'acide était plus considérable, ou la température plus élevée.

Du reste, si on essaye d'opérer la précipitation par l'acide, qui nous occupe seule, et à froid, qu'on recueille l'albumine sur un filtre, on remarque que le précipité jaunit par la dessiccation.

Comme dernière preuve à l'appui de ce que j'avance, à savoirque l'acide azotique ne peut être employé au dosage de l'albumine, je diraj qui ayant délayé 5 grammes de blanc d'œuf dans 250 grammes d'œu, je n'ai retrouvé après la dessiceation que 3 grammes d'albumine sur le filtre.

Voici quelques remarques qui ne sont pas sans utilité dans la recherche de l'albumine par l'acide azotique. Elles ont été faites par M. Méhu.

Quand on ajoute à une dizaine de grammes d'urine albumineuse 1 ou 2 gouttes d'acide azotique faible, on remarque qu'au point de contact de l'acide, il se produit un trouble qui disparaît quand on agite le liquide; ce n'est que lorsqu'on a versé une quantité suffisante d'acide que le précipité ne disparaît plus. On peut expliquer ce phénomène de deux façons :

Mais, hientat l'acide azotique réagissant sur les phosphatès alcalins et terreux du liquide, s'empare de leurs bases, et isole l'acide phosphorique qui réagit à son tour sur la petite quantité d'albumine précipitée et la redissout.

2° Une solution d'albumine pure dans l'eau distillée, mise au contact de l'acide azotique, ne se précipite qu'au fur et à mesure que l'acide est ajoutée en plus grande quantité. Si on n'en verse que la quantité nécessaire à la saturation de l'alcali combiné à l'albumine, on ne précipite qu'une très-faible quantité d'albumine.

On conçoit des lors comment une goutte d'acide azotique, ajoutéc

à une liqueur, n'amène la formation d'un trouble qu'au contact de cet acide, et qu'en agitant le tout pour opérer un mélange exact, l'albumine d'abord précipitée au contact d'un liquide très-acide, se redissolve dans la masse à péine acidifiée.

Procédé de Bodekér. — Le mode opératoire est assez compliqué, je ne veux pas le rapporter ici, d'autant plus que le procédé a été jugé défectueux par les Allemands qu'i l'ont inventé. Je me contenterai de faire comatire le principe sur lequel if répose.

Si on ajoute de l'acide acétique à une solution d'albumine de manifer à la rendre fortement acide, puis que l'on verse dans ce liquide une solution de cyano-ferrure de potassium, il se fait un précipité qui peut servir à réconnaître la présence de l'albumine et à la doser.

D'après Bödeker, l'équivalent d'albumine 1612, exige un équivalent de cyanoferrure 211,2; on n'opère pas par pesées, mais par la méthode des liqueurs titrées.

La solution de cyanoferrure de potassium doit contenir 1,300 de ce sel par litre. Chaque contimètre cube précipite 1 centigramme d'albumine, et le précipité contient environ 6 p. 100 de cyanoferrure.

Le nombre de centimètres cubes de solution de cyanoferrure, nécessaire à la précipitation complète, indique le nombre de centigrammes d'albumine que contient l'urine. Les dixièmes de centimètres cubes correspondent aux milligrammes.

Desage par le polarinière. — Ce procédé est encore plus impraticable que le précédent. Il est fondé sur la propriété que possèdent toutes les matières albuminoides, de dévier à gauche le plan de polarisation de la lumière polarisée. Il faut pour que la déviation ait lieu, que ces substances soient dissoutes à la faveur d'un acide ou d'un alcali.

D'après M. Neubauer, on se sert de l'appareil de Soleil. 1 gr.

d'albumine de l'œuf ou du sérum dissoute dans 100 cent, cubes à d'eau donne une déviation de 1 degré, si on se sert du tube de o 20 centimètres, pour la contra de contra la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra d

On voit combien est restreint l'emploi de ge procédé, puisque pour avoir une déviation de 1' il faut que l'urine contienne au moins, 10, grammes, d'albumine, par, litre, ce qui est loin d'exister dans la plupart des cas...

J'arrive maintenant au nouveau procédé de dosage de l'albumine par l'acide phénique. Dans les nombreuses expériences que j'ai faites pour la suite de ce travail, c'est toujours lui que j'ai employé, et les bons résultats que j'en ai obtenus, m'engagent à le considérer comme étant au moins aussi exact que le dosage par la challeur, et l'beaucoup plus facile à mettre en pratique, ai rue lui qui poblique que

Je le rapporte tel qu'il a été décrit par M. Méhu.

Dosage par l'acide phénique. — On connaît depuis longtemps, la , faculté que possède l'acide phénique, la créosote, et diverses autres substances, de coaguler l'albumine, et de la rendre imputrescible. L'étude de cette propriété de l'acide phénique nous a conduit à un procédé de dosage direct de l'albumine, que nous pratiquons depuis dix-huit mois environ à l'hôpital Necker.

Des, expériences multipliées nous ont convaince que l'acide phénique, ne contractait aucune, combinaison avec l'albumine : ce a

corps n'agit pas autrement que l'alcool.

L'acide phénique est trop, peu soluble dans, l'eau, pour que san solution aqueuse puisse servir directement à la précipitation de l'albumine. Dissous dans 4 ou 5 fois son volume d'alcool, il coagule assez bien, l'albumine; mais une telle, dissolution précipite en même etemps la plupart des sels minéraux; elle, a d'ailleurs dixers autres, inconvénients qui rendent son usage, impossible. En ajontant à las solution alcoolique d'acide phénique, une certaine quantité d'acide acétique, on n'a plus à redouter la précipitation des sels, des phost phates terreux principalement.

comme dans le procédé de dosage par coagulation de l'albumine par la chalcur, il est avantageux d'opérer sur une liqueur peu concentrée; il faut aussi que la liqueur soit parfaitement limpide et légèrement acide.

Voici la formule du réactif et la manière d'opérer :

o Meide phénique cristallisé. . . . 1 partie en poids o Meide acétique du commerce. . 1 partie. . . . 2 parties.

Cette solution se conserve indéfiniment sans aucune altération;

10cc versés dans une urine non albumineuse ou dans l'eau, se dissolvent complétement, et la liqueur reste limpide.

Pour doser l'albumine de l'urine ou d'un liquide extrait d'une cavité séreuse, prencz 100 grammes de ce liquide, ajoutez-y 2º° d'acide azotique du commerce, mélangez bien avec une baguette de verre; puis versez à l'aide d'une pipette 10° de la solution phénique précédente. L'albumine se précipite en flocons blancs trèsfaciles à diviser à l'aide d'un agitateur; recueillez-les sur un filtre de Berzélius, pesé à l'avance dans un parfait état de dessication.

Le liquide s'écoule rapidement; quand il s'est écoulé tout entier, lavez le précipité avec de l'eau très-légèrement aleoolisée ou phéniqué. Étalez le filtre, et desséchez-le à une température de 110°. Le filtre sec, laissez-le refroidir sur l'acide sulfurique, entre deux verres de montre, enfin pesez-le. En retranchant de son poids le poids du filtre vide, vous aurez le poids de l'albumine. Il est bien entendu que le filtre restera à l'étuve tant qu'il y perdra de son poids, autrement dit, tant que deux pesées consécutives ne donne-ront pas le même poids;

Le procédé que nous venons de décrire n'exige qu'un très-petit nombre d'instruments, et des plus simples : un verre a précipité, un petit entonnoir de verre, et une bonne balance. Tous les éléments qui déterminent la précipitation sont volatils, on n'a donc pas de surcharge à craindre dans leur emploi.

La filtration du liquide, sa séparation du précipité albumineux, peuvent s'effectuer si rapidement, qu'on n'a pas à redouter une surcharge due à l'acide urique précipité : on retrouve celui-ci dans les eaux de lavage où il cristallise.

Si l'on prend une solution filtrée de blanc d'œuf, donnant, je suppose, 1 gr. de résidu desséché à 10º, et que l'on ajoute cette dose à 100 gr. d'urine non albumineuse et bien limpide, on obtient par le procédé précédent 0 gr. 92 à 0 gr. 97. Dans ce dernier cas, on peut être sur de retrouver 2 ou 3 centigrammes d'acide urique mélangé au précipité albumineux. En moyenne, on a 0,93. Avec le sérum du sang, avec les liquides albumineux pathologiques des diverses cavités séreuses de l'économie, on obtient des chiffres qui varient dans les mêmes limies. Il faut opérer avec beaucoup de soin pour avoir des résultats exacts, à cause surtout de la dessiccation et de l'hygrométricité du précipité.

Dans le dosage de l'urine albumineuse ou de tout autre liquide, si le liquide qui s'écoule du filtre est trouble, il ne faut pas conclure que l'albumine soit entraînée, car en ajoutant un peu d'eau, surtout de l'eau alcoolisée, on rend à ce liquide toute sa transparence, parce que l'on rédissont l'acide phénique. Dans tous les cas où l'on dose de l'albumine, les eaux de lavage ne doivent plus être néellement précipitables par la solution phénique, sans quoi on m'aurait employé qu'une quantité insuffisante de réactif, ce qui est fort parce.

Le blanc d'œuf, les liquides séreux desséchés à 110 degrés, donnent généralement de 6 à 7 p. 100 de cendres, quand on les incinère à une température basse (sur la lampe à alcool) de manière à éviter la volatilisation du sel marin. Si l'on mémère le précipité donné par le réactif précédent, on n'obtent jamais 1 p. 100 de cendres: cela explique pourquoi le réactif phénique ne donné pas un rendement plus élevé. L'addition à l'urine de 60 grammes par litre de sucre de diabète, de sulfate de magnésie, d'iodure de potassium, d'azotate de potasse, de chlorure de sodium, ne change rien aux résultats. Le carbonate d'ammoniaque n'empêche pas non plus la précipitation, mais le précipité a tout l'aspect de la caséine du lait.

Quand la liqueur albumineuse est très-riche, comme celle qu'on obtient dans la thoracentèse, et même quelquefois dans la paracentèse, on l'étend de son volume d'eau distillée avant de la soumettre à ce procédé de dosage : c'est rarement nécessaire.

La solution phénique peut servir de réactif de l'albumine; elle donne même un précipilé dans l'urine albumineuse, quand l'acide azotique n'en donne déjà plus. Mais, comme en l'ajoulant en quantité trop grande à un liquide aqueux, elle abandonne de l'acide phénique qui trouble la liqueur, il faut ajouter de l'eau, et voir si le trouble ne disparaît pas; si, au contraire, il y avait réellement de l'albumine, le trouble ne disparaîtrait pas.

#### CHAPITRE IV.

#### SUR UN NOUVEAU PROCEDÉ DE DOSAGE RAPIDE DE L'ALBUMINE,

Comme on l'a vu par le chapitre précédent, il existe un grand nombre de procédés plus ou moins exacts pour doser l'albumine; mais tous nécessitent un temps plus ou moins long, et l'emploi d'une étuve destinée à sécher le précipité obtenu. Le procédé que nous allons faire connaître permet de doser instantanément la quantité d'albumine contenue dans une urine. Nous avons vu, dans le service de M. le D'Potain, tout le parti qu'on en peut tirer lorsqu'on tient à savoir, jour par jour, la marche de la maladie chez un albuminurique.

L'appareil se compose d'une caisse plate, en bois ou en carton, dans laquelle on introduit deux tubes d'essai verticaux. On pratique sur les parois opposées de la caisse, et devant chaque tube, deux fenêtres dans le milieu desquelles on fixe deux fils de fer identiques, et horizontaux. Dans un des tubes, on introduit une plaque de verre dépoli, et dans l'autre, un volume fixe d'eau distillée indiqué par un trait marqué dans le verre. Si on regarde alors au jour, on voit que le tube contenant le verre dépoli présente une teinte analogue à celle que possède un liquide albumineux chauffé : le verre dépoli, n'ayant qu'une faible épaisseur, laisse voir en avant le fil de fer horizontal correspondant.

Cela posé, si on porte à l'ébullition l'eau distillée du second tube, et qu'on y verse quelques gouttes d'une urine albumineuse l'eau se trouble, d'autant plus qu'on verse plus d'urine. On replace ce tube dans l'appareil, et on continue à verser l'urine jusqu'à ce que la liqueur ait pris une teinte identique à celle présentée par l'éprouvette contenant le verre dépoli : ce que l'on reconnaît, avec un peu d'habitude, à ce qu'on voit également bien les deux fils defer. On verse l'urine avec précaution, au moyen d'une burette graduée en dixièmes de centimètres cubes.

J'appelle chacune de ces divisions 1°, et je dirai, pour plus de clarté, qu'une urine marque 7°, par exemple, quand il faudra sept divisions de la burette pour amener l'égalité des teintes quoy sep que

Il est alors à remarquer que le volume d'eau distillée restant fixe, le degré d'une urine est inversement proportionnes à la quantité d'albumine qu'elle renferme: c'est-à-dire, par exemple, que si une urine marque 14°, l'urine deux fois plus riche en albumine ne marquera que 14° = 7°.

que  $\frac{r}{2} = 7^a$ .

Cela posé, il est facile de construire, pour chaque appareil, une getable qui donne la richesse albuminurique d'une urine quand on peconnaît le degré de cette urine rapporté à cet appareil. Pour cela, pon détermine exactement par le procédé Mehu, par exemple, la quantité d'albumine contenue dans l'urine d'un albuminurique, soit 13,21. On cherche le degré de cette urine : soit 7°.

Alors, en vertu de la proportionnalité établie plus haut, l'urine 6

de degré 1 renferme 13,21×7=92,47; l'urine de degré 2 renferme 13,21×7=92,47; l'urine de degré 3 renferme 13,21×1=11 etc. 188 à l'urine de degré 3 renferme 13,21×1=11 etc. 188 à l'urine de degré 3 renferme 13,21×1=11 etc.

On dressera ainsi, de degré en degré, le tableau aussi loin qu'on voudra. Je mets ici, pour exemple, le tableau que j'ai construit pour mon appareil.

Degree.   ob noting by asy Albumine	Degrés, ager . d to and Albumine.
4° 01 92,50	16° 5,78
20	17° 5,44
3	18° 5,15
40 23,17	19°
5°, 18,50	20° 4,67
66 10.19 7.11.1.10.0 45,42	25°
7° Trutt J, utopostol aget 143,24	300 3,09
8° 11,57	35° 2,64
9°12	.40°
10° 9,25	45° 2,06
41° 8,41	50° 1,85
120 7,71	60°
436 TH 100 Pittois . in . al. 07,44	70°
140 6,61	80°
45° 6,17	900
battu 100 gr. de blane d'œuf,	100° 0,92

On voit d'ailleurs que le degré d'une urine, variant avec l'épaisscur de la plaque dépolie et le volume d'eau distillée, varie aussi avec l'appareil : ce qui obligera chaque opérateur à dresser sa table. Les calculs sont très-simples et très-rapides.

of in nit ob a a good attraction

Bien mieux, si l'appareil se vulgarisait, il serait facile d'établir le point fixe marqué sur le tube à eau distillée, de façon que le degré des urines restât le même quel que fût l'appareil; la même table servirait alors pour tous, et le degré d'une urine indiquerait d'une façon absolue sa richesse en albumine.

En effet, admettons, que 1° coresponde à l'albunine pure : l'urine marquant deux dégrés renfermera  $\frac{100}{2} = 50$  d'albumine; en général l'urine n° renfermera  $\frac{100}{2}$  d'albumine.

Jai vérifié par de nombreuses expériences que ma table était juste à très-peu près, à la condition que l'urine fût saturé de sels. A cet effet, avant de la verser dans la burette graduée, je la jetté sur un filtre contenant du sulfate de soude, et j'ajoute quelques gouttes d'acide acétique pour disoudre les sels précipitables par la chaleur.

Pour surcroit de précaution, j'ai battu 100 gr. de blane d'œuf, dans suffisante quantité d'eau pour obtenie 1000 c. c. de liquide, l'appareil m'a donné 7°, nombre correspondant à 13 gr. 21 d'albéamine. Or, on sait que 100 gr. de blane d'œuf, contiennent précise sément 13 gr. d'albumine.

Cette expérience me permet donc de conclure à l'avantage de mon procédé, beaucoup plus rapide que ceux présentés jusqu'à ce jour.

La méthode que je viens de décrire n'est suns donte pas sans l'inconvénients, et on peut lui faire de nombreuses objections. Celle qui frappe tout d'abord lorsqu'on examine le tablean, c'est que pour les liquides très-chargées d'albumine, on obtient pour un seul degré une différence très-grande d'albumine par litre, et il est assez difficile dans ce cas d'obtenir l'égalité des teintes. Je répondrai

que je donne cette méthode pour les urines seulement et que la plus chargée que j'ai rencontrée contenait 18 gr. 50 d'albumine par litre. Dans ce cas, on peut parfaitement étendre l'urine de partie égale d'eau d'abord, puis des deux tiers, des trois quarts, et prendre la moyenne des trois observations.

Enfin un argument qui n'est pas sans valeur, c'est que les différents procédés que j'ai signalés dans la troisième partie de ma thèse ne donnent jamais le même résultat. Ce fait, que j'ai vérifié plusieurs fois, m'a été affirmé par M. le D' Méhu, dont on ne saurait contester l'autorité en cette matière. Je termine ici mon travail qui est loin d'être complet, sans doute: aussi je sollicite l'indulgence de mes juges, en leur faisant remarquer encore une fois que je n'ai pas voulu établir une méthode de dosage exact, mais simplement un procédé qui permette au médecin de constater rapidement au lit du malade si la quantité d'albumine varie dans les urines.

Vu, bon d imprimer,

Le Directeur de l'Ecole de pharmacie,

BUSSY.

Vu et permis d'imprimer,

ce-Recteur de l'Académie de Paris,

A. MOURIER.

<sup>&#</sup>x27;arre. A Paneur, imprimeur de la Faculté de Médecine, rue Mr. le-Prince, 31